



SOSPENSIONI DONAZIONE

Donazioni di sangue intero

*: criteri modificati.

SOSPENSIONI (donazione di sangue intero)

ABORTO	6 mesi dall'evento
AFFEZIONI gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie	esclusione se affezione attiva, cronica o recidivante
AGOPUNTURA	nessuna (se effettuata con aghi monouso) altrimenti 4 mesi
ALCOOLISMO	definitiva
ALLERGIA - a farmaci - stagionale - vaccini desensibilizzanti	- un anno dall'episodio - durata - 3 giorni dall'ultima dose
ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE MINORI - blocco di branca destra incompleto - blocco A-V 1° grado - altri blocchi di conduzione A-V o ventricolari ARITMIE - fibrillazione atriale cronica o recidivante - s. di Wolff-Parkinson-White - altre	- idoneo - idoneo - definitiva - definitiva - definitiva - da valutarsi con consulenza cardiologica AVIS
ASBESTOSI	definitiva
ASMA CRONICA (in trattamento)	definitiva
AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni)	definitiva
BPCO	definitiva
BRUCELLOSI	due anni dalla guarigione
BABEBIOSI	definitiva
CARDIOPATIA ISCHEMICA	definitiva
CALO PONDERALE NON MOTIVATO	sospensione in attesa di accertamenti
CITOMEGALOVIRUS	sei mesi dalla guarigione
COMPORAMENTI SESSUALI - cambio partner (partner stabile) - partner occasionale - partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV - comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue	- un mese da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva
CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE	quattro settimane
CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE - epatite B - epatite C - <i>*Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica:</i>	- fino a sviluppo anticorpi HBsAb a titolo protettivo (post vaccino, se HBsAb neg) - definitiva se partner sessuale -idonei

<p>CREUTZFELD-JACOB DISEASE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trapianto di cornea, somministrazione di ormone della crescita ricavato da ipofisi umana, casi familiari della malattia, farmaci con estratti bovini. - Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996 - Trasfusioni ricevute nel Regno Unito dopo il 1980 	<p>definitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - definitiva - definitiva - definitiva
DIABETE MELLITO	- definitiva (ad eccezione delle forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl)
<p>DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - otturazioni, medicazioni (anche senza anestesia), estrazioni. - ablazione tartaro - implantologia - utilizzo gel piastrinico 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 giorni - 2 giorni - due mesi - quattro mesi
<p>DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE) DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - da valutare
DISENDOCRINIE	<ul style="list-style-type: none"> - definitive se in trattamento ed a patogenesi autoimmune - iper-ipotiroidismi: possibile riammissione dopo un anno dalla sospensione del trattamento se eutiroidismo e non autoimmunità
<p>DROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - leggera (solo h e m) - pesante 	<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi - definitiva
ECOGRAFIA TRANSLUMINALE	idoneo
EMBOLIA POLMONARE	definitiva (se primitiva o trombofilia)
EMOGLOBINA (livelli di)	<ul style="list-style-type: none"> - sangue intero : >13.5 M ; >12.5F - plasmaferesi: > 12.5 M ; <11.5 F
ENDOSCOPIA	quattro mesi
ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA)	Idoneità solo per plasmaferesi, solamente se dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione definitiva
<p>EPATITE A</p> <p>EPATITE B</p> <p>EPATITE C</p> <p>EPATITE da eziologia indeterminata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - un anno dalla scomparsa IgM - definitiva, ad eccezione di soggetti diventati HBsAg negativi, con HBsAb a titolo protettivo - definitiva - definitiva
ESANTEMATICHE (malattie esantematiche)	15 giorni dalla guarigione
EPILESSIA	definitiva- ad eccezione convulsioni febbrili in età pediatrica (1 solo episodio isolato- no terapia a lungo termine)
ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.)	un anno

ETA' - sangue intero (periodici) - sangue intero (accettazione nuovi donatori) - aferesi	- > 18 anni, fino a 65 anni - > 18 anni, fino a 60 anni - > 18 anni, fino a 60 anni
EXTRACOMUNITARI	- I soggetti che hanno vissuto nei primi 5 anni di vita o comunque per 5 anni consecutivi in zone ad endemia malarica sono idonei per sangue intero solo se risiedono in zone extramalariche da più di 3 anni, purchè asintomatici (altrimenti idonei per plasmaferesi). *Questi soggetti, dopo ogni successivo soggiorno in zone malariche, hanno obbligo di donare solo plasma per 3 anni, trascorsi 3 mesi dal rientro. - Idonei se discreta padronanza della lingua italiana , residenza regolare, documenti di identità e codice fiscale.
FARMACI - antiinfiammatori FANS - antibiotici orali - antibiotici parenterali - antidepressivi - cortisonici - antistaminici - H2 bloccanti / inibitori pompa protonica - ansiolitici / ipnoinduttori - eparina - finasteride e dutasteride - antagonisti recettori alfa - statine - terapia ormonale sostitutiva per menopausa - estroprogestinici orali - ormoni tiroidei - beta bloccanti - ace inibitori e sartani - acitretina (Neo Tigason) - altri retinoidi (Roaccutan) - utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping) -* venoprotettori (es.diosmina)	- 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT) - 15 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 30 giorni - 10 giorni - 5 giorni - 3-7 giorni - 90 giorni - 60 giorni - 5 giorni - 5 giorni - nessuna sospensione - nessuna sospensione - definitiva se pat. autoimmune e comunque durante il trattamento - esclusione aspirante; definitiva per donatore periodico che inizia la terapia; nessuna per donatore periodico già in terapia da diversi anni. - definitiva per aferesi - sospensione definitiva - 1 mese - definitiva - 5 giorni
FEBBRE > 38 C°	due settimane dopo la cessazione dei sintomi
FEBBRE Q	2 anni dalla guarigione
FILARIOSI	definitiva
FORO ORECCHINO	quattro mesi (idoneità se utilizzati strumenti a perdere)

GASTRORESEZIONE PARZIALE PER ULCERA PEPTICA	- sospensione sangue intero - idoneo per plasmaferesi
GLAUCOMA	- nessuna sospensione
GLOMERULONEFRITE ACUTA	cinque anni dalla guarigione
GLOMERULONEFRITE CRONICA	definitiva
HERPES SIMPLEX	- una settimana dalla guarigione
HERPES ZOSTER	- due settimane dalla guarigione
HTLV I/II	definitiva
IMMUNOGLOBULINE	quattro mesi
INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO)	quattro mesi
INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA	definitiva
INFLUENZA	due settimane dalla guarigione
-INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale) <i>ad eccezione taglio cesareo: un anno</i> - INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE	-quattro mesi - quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo - un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni)
INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE)	due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.)
IPERTENSIONE ARTERIOSA	- range accettabilità(sangue intero) <ul style="list-style-type: none"> • P.A max: 110/180 • P.A min: 60/100
IPERTENSIONE IN TERAPIA	- v. voce “farmaci”
ISCHEMIA/ EMORRAGIA CEREBRALE - TIA	definitiva
LEBBRA	definitiva
LEISHMANIOSI	definitiva
LYME (malattia di Lyme)	definitiva
MALARIA (malattia)	- sospensione definitiva per sangue intero - idoneità per plasmaferesi , 6 mesi dopo la guarigione
MALATTIE AUTOIMMUNI	definitiva
MALATTIE EMATOLOGICHE - Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) - Coagulopatie sintomatiche - talassemia	- definitiva - definitiva - definitiva

- trait talassemico - favismo - gammapatia monoclonale (comprese MGUS)	- idoneità solo plasmateresi ,se Hb a livelli adeguati - definitiva - definitiva
MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA)	definitiva
MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON...)	definitiva
MALATTIE PSICHIATRICHE - depressione - psicosi	- guarigione - definitiva
MALATTIE VENEREE (lue)	definitiva
MESTRUAZIONI	possibile donazione se non dismenorrea
MONONUCLEOSI	sei mesi dalla guarigione
NEOPLASIE MALIGNI -eccezione: carcinoma basocellulare,	- definitiva - un anno dall'asportazione
CIN 3 al Pap-test	- da valutare dopo follow-up (5 anni)
OSTEOMIELITE	due anni dalla guarigione
PARTO	un anno
PIERCING	quattro mesi (idonei se utilizzati strumenti a perdere)
PESO CORPOREO	superiore a 50 Kg (<i>anche per aferesi!</i>)
PUNTURA DI ZECCA	tre mesi
REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (MALATTIA REUMATICA)	due anni dalla guarigione
SARCOIDOSI	definitiva
SIFILIDE ACCERTATA ANCHE PREGRESSA	definitiva
SILICOSI	definitiva
SPLENECTOMIA POST TRAUMATICA	- definitiva per sangue intero - idoneità per plasmateresi
TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE	quattro mesi
TIFO O SALMONELLOSI	un anno
TOSSICODIPENDENZA (DROGHE PESANTI)	definitiva
TOXOPLASMOSI	sei mesi dalla guarigione clinica
TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI	quattro mesi
TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto di cornea)	definitiva
TRASFUSIONI - INFUSIONE EMODERIVATI (donatori con partner trasfuso)	quattro mesi quattro mesi
TRIPANOSOMIASI	definitiva
TUBERCOLOSI	due anni dalla guarigione
ULCERA PEPTICA	- scomparsa sintomatologia al termine terapia; - se positività HP: un mese dal termine terapia eradicante, in assenza di sintomi

<p>VACCINAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale (Sabin), antivaiole, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifida) - vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antiepatite B, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale –<i>Salk</i>–, antirabbia –<i>profilassi</i>–, antimeningococco, antipneumococco) - vaccino anti rabbia dopo morso di animale 	<ul style="list-style-type: none"> - quattro settimane - 48 ore se apiressia - un anno
<p>VIAGGI EXTRA-EUROPA (vd. elenco)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tre mesi - per zone ad endemia malarica: sei mesi - viaggio in USA: un mese dal rientro
<p>VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE:</p>	<p>Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Sospensione di 28 giorni dalla guarigione.</p>

Approvato dal Coordinatore DMTE BG....

Approvato dal D.S Provinciale

